

萬氏家傳育嬰

重校萬氏家藏育嬰家秘卷之二

羅田容齋

胎疾

孩兒初生襁褓中

如苗秀實漸成童

四因內外能分辨

治不乖方大有功

幼科立方古有定制。見初生後病者。惟以膏丹化而服之。蓋以實蒸未定。腸胃脆弱。恐不勝藥。則立調治乳母之法。一歲之後。則有湯藥。與大人同。但劑小耳。

有因氣動而病生于內者。如驚病。虫瘕之屬。驚用安  
神丸。內疳用木香丸。虫用虫丸。癖用消癖丸。  
有不因氣動而病生于內者。如傷乳食之屬。初傷以  
胃苓丸和之。和之不去。以保和丸消之。消之不去。以  
脾積丸取之。量兒虛寒。勿損胃氣。

有因氣動而病生于外者。如結核。虫疥。丹瘤之屬。結  
核用家秘內消丸。虫疥用苦參丸。丹瘤用疔法。  
有不因氣動而病生于外者。如傷風。傷寒。傷暑。傷濕  
之屬。風用瀉青丸。防風。惺惺散。寒用理中丸。藿香正  
氣散。暑用涼驚丸。黃連香薷飲。濕用胃苓。天水。五苓

散

胎疾初生治較難

幼科証治若空談

丹溪妙論如繩墨

家秘書中次第看

小兒胎病有不必治有不可治者常觀內經巔疾之  
文東垣紅絲瘤之論則兒疾之生于父母者似乎不  
必治矣一臘之臍風不治百晬之痰咳難醫未三月  
而驚搐者凶恰一月而丹瘤者死又不可治者矣  
今幼科有胎熱胎寒胎肥胎瘦胎驚胎黃之論証治  
雖詳豈小兒常服之藥也况寒熱者胎胚之餘毒也  
肥怯者父母之賦予也非惟不可治亦且不必治矣

惟丹溪論治胎毒者只調治乳母其法誠幼科之綱  
墨典

胎寒者母娠時多熱病乃服寒涼之藥令兒受之生  
後昏昏多睡間或吮乳漏白此其候也或百日之內  
忽病戰慄口冷手卷曲不伸手亦握拳腹痛晝夜啼  
哭不止此生后受寒得之亦名毒胎宜服溫補之劑  
當歸散主之乳母宜服釀乳當歸散

當歸散 治小兒胎中受寒生下再感外風面色青  
白四肢厥冷大便青黑及腹痛盤腸內痼

歸尾 酒

黃芪 案

人參

細辛

龍骨

桂心

赤芍

并草

各分

為細末每服一字以乳調下

釀乳當歸散

乳母服之

當歸

川芎

赤芍

生地

香附

炙炒各等分

桂心

煨姜各減半

以咀水煎食后服少頃捏去宿乳與兒吮之

胎熱者身煩時喜食辛熱魚炒之物或患熱病失於

清解使兒受之生后目閉面赤眼胞浮腫常以身努

呢呢作聲或時啼斗或時驚煩遍身壯熱小便黃澀

此胎熱也若不早治則丹瘤瘡癰由此生矣宜用辛

黃連炙甘草各等分為末入硃砂半和勻生蜜調成  
劑每取豆許大納兒口中令其嚥下乳母宜服釀乳  
赤芍散

生地酒

黃葵

川芎

骨脂

木通酒

炙草

赤芍

天花粉

連喬各等

吹咀加淡竹葉水煎食后服令乳母捏

去宿乳亦須少與兒吮之

胎驚者母娠時曾因驚悸氣傳于子子受之生後頻  
煩發驚此胎癰也不可治治之無功如因有熱發搐  
者必先啼哭亦名胎驚用燈心湯下東垣安神丸效

搐不止者此真搐也勿治

又方 治小兒胎中受驚生未滿月而驚啼用

黃連珠砂 射少許研細取猪乳調稀納入口中又

用全蝎一枚以生薄荷葉裹之線札定火上炙焦為

末分四服入珠砂射少許麥冬湯調下

胎黃者兒生下面目身盡黃者亦胎熱也治同法

胎肥者兒生下遍身肌肥肉如血色紅滿月以后漸

漸羸瘦

胎怯者兒生下目無晶光面無華彩身無血色此二

二者乃胎稟不足之病宜服地黃丸方見前



又用沐體法

天麻二錢 蝎稍五分 硃砂五分 白凡

膏黛 三射香

一字 烏梢蛇肉三錢 酒洗焙乾同研

未每用三錢水三碗桃枝一握並葉五六片同煮十沸去渣溫熱浴之勿沐替

一 小兒初生遍身無皮俱是赤肉。用白菓粉遍身搽上。候生皮乃止。

一 小兒初生如魚泡。又如水晶。破則水流。用蜜陀僧研極細擦之。

小兒胎疾有胎稟不足並宜地黃丸。有胎毒者如胎熱法。所謂胎稟不足者各隨五臟論之。如語遲心氣

不足也。心主言行，違者肝氣不足也。肝主筋，齒髮不生者，腎氣不足也。髮者血之餘，腎主血，齒者骨之餘，腎主骨。吐瀉頻併者，脾胃之氣不足也。脾胃為水谷之府，帝穀短者，肺氣不足也。肺主殺。

### 臍風証治

臍在身中號命關

衝任在此養靈根

最宜調護無傷損

總少差也減壽元

臍在兩腎之間，謂之命門，乃人之根本也。衝任二脉皆起于臍之下，任脉自中而上，至于人中，與腎脉合。衝脉二道夾任脉而上，散于舌下，與脾脉合。胃脉

二道又夾衝脉任脉而上入于鬚中。上下往來如環無端。故男子十六歲而精行。女子十四歲而血動。任脉行。衝脉滿。胃脉寔也。小兒初生三脉方具。而臍之千係尤重也。所以斷臍之時不可不慎。或剪臍帶太短。或結縛不緊。致外風侵于臍中。或用鉄器斷臍。為冷所侵。浴兒時或牽動臍帶。水入生瘡。客風乘虛而入。內傷于腎。腎傳肝。肝傳心。心傳脾。脾傳肺。肺蘊蓄其毒。發為臍風之病。其症面赤啼哭者。心病也。手足微搐者。肝病也。唇青口撮痰涎壅塞者。脾病也。牙關緊者。腎病也。啼聲不出者。肺病也。五臟之中。畧見一

二臟之証者病猶可治悉見不能美

臍風幼子幾遭傷

一臟之中最不詳

識得病在何處起

無求無患早隄防

小兒初生一臟之內惟臍風為惡候也如臍腫腹痛啼哭不止唇青口撮者曰臍風牙關緊急吮乳不得啼聲不出者曰禁風肚腹緊脹腸若雷鳴大小便不通者曰鎖肚此三者同一病也但症不同耳俗名馬疳風者是也三症多死臍腫唇撮者脾胃之氣絕于中也禁風乳食不入者心肺之氣絕于上也鎖肚大小便不通者肝腎之氣絕于下也任脉止衛脉閉胃

脈散如之何不死欲免此症須要提防

預防法

小兒初生十日之內但覺噴嚏多啼不乳

者此將發之候也急抱兒向明處視其喉中懸癰上  
脣有小泡如珠之樣相聚者即用銀窰耳或平指甲  
刮去之以軟綿蘸甘草汁拭去其血去之早而泡白  
者無慮也其色黃或有泡痕在而落入腹中者急用  
硃砂牛黃射香各少許研細取豬乳汁調稀抹入口  
中或取豬乳汁一二匙與兒吞之佳蓋豬乳汁主小  
兒口噤不開最良

又法五苓散加

當歸

川芎

木通

木香

除此不煎  
入藥內

與乳母服如上法

若失預防之法其病將來而口斷振啼多乳少者此

腹中痛也內病同宜五苓散加當歸莫萊莫炒

木香

乳香

沒藥

鈎藤銼

為極細末乳拌如

芡寔大納兒口中服之無時乳母仍服上五苓散又

取附子桂等分為末生薑自然湯調作餅約一分厚

與臍相等放在兒臍上以帛托住上用熨斗火熨之

如諸症悉見不可治也

按古方治臍風者初用控涎膏吐風痰次用益胃散

和胃又用辰砂膏利驚此良法也又用僵蚕全蝎蜈

蜘蛛諸毒藥以怯禁風者此皆治其標也不治其  
本而治其標故鮮克有濟者矣然父母愛子之心必  
欲救之醫有活人之心不可不救也病輕各如上以  
五苓散為主蓋五苓散是太陽膀胱之裏藥也澤瀉  
茯苓以養心安神官桂其荑萸黃當歸以伐肝臟寒和  
之氣白朮茯苓以去脾臟寒濕之氣木香乳香沒藥  
以止腹中之痛官桂茯苓澤瀉諸苓又去腎中之濕  
以鈞藤官桂去風之痛以人乳和之或乳母血之所  
化其氣用也若有痰者本方加胆星末口噤者加白  
僵蚕末更加人參末服之加大便不通者宜三黃餅

毒丸下此急則治其標也去其惡毒之后如此法治之。臍風之病有胎毒者十無一生。吾見人家難于子息者所生之子多以臍風死如東垣所論紅絲瘡之事是以知之。

臍瘡者其帶因有所犯而落故根未斂潰腫而成瘡也。宜白龍宜枯凡黃柏三味為末敷之甚妙。要宜常看勿使抱裙之內有尿濕也。

臍突者小兒多啼所致也。臍下為氣海啼哭不止則觸動氣氣動于中臍突于外理之常也。其狀哭出者光浮如吹起者捏按則微有聲此症鄉俗但遇婦人



挑水來者即抱兒以突臍當擔頭上觸之不拘日數  
以臍入為度每試輒效亦良法也吾見小兒臍突者  
多難養由于多哭也

不乳似癆風小兒生下三日之內忽有不乳者當審  
問之勿以不乳似癆風治也癆有多啼撮唇之症若  
此無之但不乳也有吐乳乳之又吐者或因拭口不  
淨惡物入腹也用黃連甘草木香木瓜各少許為末  
每用少許納兒口中乳汁下如有啼哭不乳者此腹  
痛也乃胎寒症宜上方去黃連甘草加乳香沒藥以  
當歸湯少許煎調如上喂之加無上症無故不乳者

問其母之乳汁多少有乳多者傷乳也宜少斷之  
久自思乳矣乳少者必有他症心誠求之

### 變蒸証治

草木逢春變化新

太和元氣日薰蒸

細推物理皆如是

莫把芽兒作病名

天地之造化陽主生長陰主收藏故草木之生長于  
春夏者陽之舒也收藏于秋冬者陰之慘也幼科書  
中變者變生五臟也蒸者蒸養六腑也以變蒸二字  
分臟腑論又有變蒸之後有三大蒸之說后人因之  
莫有覺其非者故予直解之曰變者變易也謂兒之

知覺運動以漸而發也。蒸者蒸然發熱也。形神變易之時，真陽發舒之象也。人之生也，一歲而變蒸，是男子八歲而真牙更，十六歲而精動，六十餘歲而精竭，女子七歲而真牙更，十四歲而經行，四十九歲而經止，此天地陰陽之氣，其分教固已定矣。其一歲之內，變復有三大蒸之論者，誠未達其旨也。若一歲之內，變蒸之日，似亦不可執也。形有強弱，氣有清濁，變有遲速，故形壯氣清者，其變常速；形弱氣濁者，其變常遲。謂三十二日一變者，乃舉其大數如是也。至于形之強弱，氣之清濁，則又稟于父母，出于造化，陰陽之殊也。

幼科中治夏蒸者發熱方用黑散子麻黃杏仁發表藥也大黃攻裏藥也表裏無邪不知此法如何而立夏蒸之熱生于其中發于其外自有微汗而解按仲景論有陽寒不宜汗下之戒如是方者誤兒多矣

兒當夏蒸之時或有傷風或有傷食者法當治之先後補瀉不可不辨如先有所傷兒後夏蒸者邪氣盛而正氣受傷當先瀉後補也先夏蒸而後有所傷者正氣虛而邪氣乃湊也當先補後瀉家秘之法挾外感者宜單裡之法以發散挾內傷者宜枳朮丸研細與之更節其乳有客忤者宜至聖保命丹薄荷湯研

服或吐瀉者錢氏異攻散加藿香葉共作細末蜜為

丸如芡寔大每服一丸米湯化下

小兒痘蒸過如蒸不除者調其乳毋用加減小柴胡

湯 人參 柴胡 甘草 麥冬

生地 木通 陳皮 等分

淡竹葉水煎食後服如前法

有痘蒸咳嗽痰壅鼻塞較重惺惺散要方也方見傷

寒

又浴法 用白正<sup>上</sup>或苦參煎湯抱兒向避風處浴之

有痘蒸發搐者此熱甚生風亦胎驚也宜尋驚風法

治之。湧肝湧青丸。湧心湧赤散。如先發驚搐方治正後。變蒸又發者。此胎驚將成癇也。勿用正法。此有痰伏心中。宜安神去痰。錢氏安神丸。生之方見心証。

### 急慢驚風

兒在母腹中。只是一塊血肉耳。及其生也。啼聲一發。以後九竅開張。四肢蠕動。如憂初覺之象。肌骨嬌嫩。又如草木萌芽之象。故曰芽兒。以漸壯健全。賴父母之養。一旦有病。醫藥之助。不可無之。然病有三因。須明辨之。有因于胎毒者。如丹疹瘡癍之類。宜解其毒。如幼嬰解毒延齡丸。通源解毒湯之類。是也有因胎

稟不足者如解願五軟之類是也。宜地黃丸主之。有因外感風寒暑濕之氣得者謂之外因。有因飲食寒熱之傷得者謂之內因。有客忤傾跌湯火得之者謂之不內外因。如外因者發散之。內因者消導之。不內外因者各從其症治之。臨機應變不失其宜可也。

幼嬰延齡解毒丹

解胎毒氣初生下便宜服之

用胞衣餘帶近衣者不拘長短剪下炭火上焙乾為末。每一錢加甘草一錢。淨黃連五分。硃砂飛三分。為細末。用生蜜和勻。分作七服。每日取豆大許納兒口中。以乳送下。七日去其腹中之穢毒。自無風之疾。

也。通源解毒湯

兒有胎疾乳母服之此四物湯方

當歸

川芎

生地

人參

連翹

黃連

皮

甘草

木通

水煎濃入竹瀝服之

丹溪曰乳母致病事起于孩人多玩忽醫所不知故乳母稟受之厚薄性情之緩急骨肉之堅脆德行之善惡令兒相肖為大關係不可不格也

驚風總論

小兒大病是驚風

急慢陰陽便不同



採集前賢諸秘訣

指揮後學救孩童

錢氏云急慢或聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下之此症本因熱生于心身熱面赤嗜飲口中氣熱大小便黃赤則熱也蓋熱甚則生風風屬肝此陽盛陰虛也故下之以除其痰也不可與巴豆大溫藥下之恐觸虛熱不消也小兒熱痰客于心間因聞非常之聲則動而驚搐矣若熱極不聞声及驚亦自發搐也按錢氏治之用利驚丸亦以硃砂膏代之

慢驚因疾後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻出氣亦

冷手足時瘕痲昏睡露睛此無陽也按錢氏曰  
湯不知其義今用調元合建中湯

急慢驚陰陽異証切宜辨而治之急驚合涼瀉慢合  
溫補如不分別則誤甚矣

陳氏曰小兒平常無事忽發肚熱手足搐搦眼目戴  
上涎潮壅塞牙關緊急身熱面赤此急驚風屬陽病  
在腑當治以涼如面白身無熱口中氣冷多啼不寐  
目睛上視項背強直牙關緊急涎潮或自汗此慢驚  
風屬陰病在臟當治以溫

肝驚眼赤面青糞下青白心驚面皮紅赤夜啼至晚

肺驚氣喘飲食噎中痰鳴腎驚夢中咬牙睡中驚哭  
肥驚五心煩熱乾嘔腹脹不食

按陳氏治慢驚風初去痰用芎蝎散次溫中用油珠  
膏后補元氣用補脾益中湯多辛燥之藥今改用沉  
香礞石丸以降其痰調元建中湯加附子以溫其中  
十全大補湯以復其元氣或參苓白朮散

緊古云急驚陽証也俱腑受病耳小兒客痰熱于心  
膈是少陽相火旺經云熱生風因時火盛而作蓋東  
方震木得火氣而發搖木火不動得風而動兩用利  
驚丸導赤散瀉青丸地黃丸主之擒止服安神丸乃

東垣安神丸也

慢驚陰証也。俱臟受病耳。小兒吐瀉病久。脾胃虛損。若不早治。則成慢驚。名曰痰厥。以搐而非真搐也。因脾虛損。故大便不聚。當去脾間風。則其利自止。既以失治。則脾肺俱虛。致按木所乘。是為慢驚也。當用溫補。按絜古用宣風散。以導脾間之風。不知其義。蓋脾胃虛損。豈可用牽牛大瀉元氣。此不可服也。用益黃散。羌活膏。皆犯辛熱大耗真氣之藥。不如東垣之論其義最精。見后。

東垣曰。外物驚宜鎮心。以黃連安神丸。若氣動所驚。

宜錢氏寒水石安神丸。大忌防丰丸。治風以辛溫之藥必殺人。何也。辛散溫浮熱火也。

因驚而瀉青色。先治肝以硃砂之類。勿犯寒涼之氣。大禁涼驚丸。風木旺必尅脾胃。當先寔其土。后瀉其木。閻孝忠集錢方以益黃散補土。誤矣。其藥有丁香辛熱以助其火。土旺土愈虛矣。青橘皮瀉肺。丁香熱大瀉肺。與大腸脾寔當瀉子。今脾胃虛反更瀉子而助火重虛其土。殺人無疑矣。其風木既旺有闢脉洪大掌中熱腹皮熱。豈可以助火瀉金。今立一方。火補金。大補其土之為神治之法。宜黃芪湯主之。乃

治驚慢之神藥也。即調元湯加芍藥是也。

丹溪曰：驚風有二。慢驚，傷脾虛所主，多死，宜溫補。一云溫補宜參朮煎湯下。安神丸急驚，屈痰熱，宜涼驚。一云用養血藥作湯下降火清痰。九子錢氏涼驚丸。世以一緊通治二証，甚謬。

急慢發熱，口瘡，心肺伏熱，痰熱，痰嗽，痰喘，並用湧法。重則瓜蒂散，輕則用苦參末、小豆末，以淡蒸汁調服。吐之，吐後搐定，更宜防風通聖散為末，蜜丸服之。全嬰方云：驚証因風，則目青；面紅發搐，其病在肝；舌驚，舌瘡，面赤，忽然作聲發搐，其病在心；因食則嘔吐。

氣而發搐其病在脾皆陽病也脾胃經虛則生粘痰痰涎者脾胃所出也痰則凝滯在于咽喉如牽鋸之聲時復痰涎或因吐瀉所致脾虛則肺亦虛痰涎流溢其証亦然此陰病也

身熱脉浮精神恍惚或吐瀉不思乳食發搐即半陰半陽合病身熱脉沉精神倦怠或吐不瀉又能乳食發搐亦半陰半陽合病者也

亦有急驚瀉涼而不愈或與吐下藥太過者變為慢驚又有慢驚溫補而不愈變為急驚者急慢驚風症有陰陽症有順逆搐有真假治有次第

不可不知其候可預防者如目鮮目眩目白目青目  
斜目閉目轉目瞪聲寔聲啞聲戰聲輕啞口弄舌蹇  
舌露筋噓風撮口噎乳噎食忽然定睛吐涎沫扭項  
搖頭仰身擦面藏頭畏明手掣手戰脚掣不伸忽擦  
忽亂失張失志精神恍惚睡卧不寧睡中喜笑困噤  
噤齟心煩噪哭咬人面脰色變或紅或青身舒用力  
呢作聲者已上症候乃急驚之先兆也宜預防之  
驅風膏錢氏抱龍丸

凡見搖頭斜視以手抹人昏睡喜卧額上多汗○亦  
粘汗其脉沉細即是慢驚之候宜急溫之調元湯



中湯定心丸主之。病有陰陽急驚風屬實熱病在肝心二臟謂之陽癇。慢驚風屬虛寒病在脾肺二臟謂之陰癇。此以寒熱分陰陽也。五臟為陰六腑為陽急驚發於六腑為易治慢驚發於五臟為難治。此以臟腑分陰陽也。証分順逆者男發搐目左視握拳拇指在外者為順反此者逆女發搐目右視握拳拇指在內者為順反此者逆。蓋天地之道陽左陰右陽外陰內也。錢氏云男發搐目左視無声右視有声女發搐目右視無声左視有声相勝故也。蓋震東兌西男女之定。

位也。震屬乙木，兌屬辛金。肝肺之分位也。男子主於寅而左行，女子生於申而右行。左右者陰陽之道路也。今男播左視無聲，寅乃甲之旺位，乙之從甲，妹之從兄也。故為順而無聲。右則從庚乙，與庚合金，木相擊而有聲也。女播右視無聲，申乃庚金旺位，辛之從庚，妹之從兄也。故為順而無聲。左則從丙辛，與丙合火，金相灼而有聲也。活幼心書：順播散可取用之。如此觀之急驚風為順而易治，慢驚風為逆而難治。播有真假。此錢氏論百日内發播之証也。真者不過三兩以必死，假者發頻不為重。真者內生驚癇，假者

外生風冷。蓋血氣未貫不能勝任。乃發搐也。欲知假者。口中氣出熱也。治之可發散。按錢氏肝主病云。氣溫則內生。氣熱則外生。外生者病在表。故可治。發散宜瀉青丸。去大黃加天麻全蝎主之。內生者病在裏。乃氣動之病也。周歲以後小兒宜瀉其本脏。當歸龍薈丸主之。治有次第。初發搐時。卒然昏絕。牙關緊急。俗用掐法。灸法以醒其驚者。蓋不知昏絕口禁。皆痰涎壅塞之所為也。輕者可掐可灸。即醒。重則先用嚏驚散吹鼻中。嚏出可治。不出則用辟瘟散。必醒。如不嚏不醒不

可治也。次用開閉散擦牙涎出自開。然後進藥。急慢同法。

如痰涎壅塞或吐之。或利之。皆非其治也。蓋痰之上壅者火載而上也。辟如釜中之水益沸。故云揚湯止沸。不如釜底去薪。今不瀉火而但吐之利之。前痰雖去。後痰壅塞復至矣。急驚風用珠砂膏。揭風湯。甚則用蒙石滾痰丸。慢驚風用星香散。甚則以礞石丸降之。痰去則搐自止矣。搐不止者。依後法治之。搐止驚退。可以安也。急用錢氏涼驚丸。慢用溫驚定心丸。此用急慢。驚風始終之要藥也。

急慢驚風氣喘氣鳴手足冷皆不可治

急慢二証貴先知

風在肝經食在脾

驚恐傷心神志亂

現其發搐在何時

錢氏曰傷風得之口中氣出熱呵欠頻開手足搖動

當發散小兒本怯者多此病也

錢氏曰因食得之身體溫多睡多唾或吐不思食而

搐當先定搐後安神

兒因嬉戲指一蟻以阻之者或因啼哭扮稱異類以

止之者皆能作搐蓋心藏神心主驚則傷神腎藏

志腎主恐則傷志神志既傷則心腎俱虛而胆亦

怯矣。如此搐者，若作驚搐治之，誤矣。宜補心腎之神志，定志丸主之。

錢氏曰：病潮熱，寅卯辰時，身作壯熱，目上視，手足掣動，口内生熱涎，煩悶煩急，此肝旺也。繫古云：潮熱于寅卯辰時，木旺之位是肝旺也。當先補腎水以制心火。地黃丸後瀉肝以止其搐。瀉青丸。

因潮熱，巳午未時發搐，心神驚悸，目上視，白睛赤色，牙關緊急，口內涎潮，此心旺也。繫古云：巳午未時火旺之位而熱搐者，心熱也。宜赤散涼驚丸。錢氏方或木通散以瀉心肝之火。

因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微邪視身体似熱  
睡露睛手足冷大便淡黃是肺旺也。案古云申酉戌  
時金旺之位而肝木強。法當補脾。恐被木之賊所尅  
害。當瀉心肝以挫其勢。而后補肺。按瀉心肝宜木通  
散。補脾宜錢氏異攻散。治肺又小阿膠散。  
因潮熱亥子丑時不甚搐而卧不穩身体溫壯目睛  
緊斜視喉中有痰。大便銀褐色。乳食不消。多睡不醒。  
案古云皆因大病之後脾胃虛損多有此病。故宜補  
脾涼心。按補脾宜異攻散。涼心宜涼驚丸。皆錢氏方。  
按錢氏案古論日夜發搐之証治亦有陰陽之分。寅

卯辰巳午未陽之位也申酉戌亥子丑陰之位也故  
肝心之搐多用涼瀉肺脾之搐多用溫補也

他病傳來發搐多

或因搐後變他癰

能將脈証分虛實

從本從標治不訛

癰風發搐此胎毒也兒生一臘之內多啼不乳或撮  
唇或牙關緊或肚大或臍尖發搐者此胎驚也爾之  
直搐生于內者氣喘痰鳴手足冷者不治詳見癰風  
變蒸發搐此胎病也因變蒸之後或傷風或傷乳或  
突驚或發搐百日之內搐有真假說見前皆曰胎驚  
真搐者頻發必死假搐者少宜散風化痰安神至聖



保命丹主之。百日以後發搐。口中氣熱。此肝旺病也。宜瀉青丸竹葉湯入沙糖少許化服。後以至聖保命丹安神。如逢變蒸之期。必發搐者。此胎癰也。自內生者。若不急治。後成終身之病。宜安魂鎮心定魄頌。細與服之。以不發為度。秘傳三聖散主之。

白滑石

飛兩

甘草

二錢

和勻作三分一用青黛一

錢和勻名安魂散。早以淡竹葉湯下。

一用硃砂

飛一錢和勻名鎮心散。午用灯心湯下。

一用苦

梗細末和勻名定魄散。晚用蘇葉湯下。

外感傷風發搐。其病在肝。即前傷風發搐也。治同法。

如肝有風甚則角弓反張似天癎似痙症此有搐也  
宜用肝散風。蓋足厥陰經之脉隨腎脉循脊裏上至  
巔頂脊傍兩行。則足太陽膀胱脉也。故風甚同見証  
也。宜加減寧合湯主之。如脊下客三指者不治。

人參

柴胡

黃芩

杏仁

去尖

麻黃

不去根  
切一分

甘草

川芎

葛根

升麻

羌活

當歸

防風

石膏

此瀉青柴胡麻黃湯根四方加減也共為

細末釣藤湯調服

傷食發搐其病在脾謂之食癎即前傷食搐病也搐

甚者如前治法太甚者宜用輕劑下之去其食熱三黃枳朮丸主之

黃芩二錢

黃連酒洗

大黃酒洗

神麴炒

陳皮

白朮錢各一

枳實五分

為末湯浸蒸餅丸百沸湯下

中暑發搐一名暑風宜清暑涼心下痰安神却暑丹

主之

五苓散乙兩

黃連末

甘草末各二錢

硃砂

飛錢

和勻蜜丸如芡實大每服一九麥門冬煎湯下此辰砂五苓散也

霍亂發搐其病在胃此乾霍亂也神氣變亂心腹絞

霍亂發搐其病在胃此乾霍亂也神氣變亂心腹絞

為不吐不瀉所以邪氣上下不得出陳氏所謂氣逆而作噎痰聚發驚是也不急治之必死先用瀉吐法宜瓜蒂散吐出積食痰散氣順後和其胃氣以藿香正氣散主之

藿香

紫蘇

白芷

各一錢

厚朴

姜炙

白朮

陳皮

去白

桔梗

半夏

各四錢

甘草

炙一錢

加枳實

夫六分

為細末

姜汁調下

吐法

瓜蒂

猪牙皂

硃砂

共為末

每少許以淡豆豉湯服即吐

吐瀉發噎者病在肝先病吐瀉后發噎者此因吐瀉

不止。脾虛生風，乃慢驚風也。治法同後，但吐瀉未止。

又加發搐者，宜參苓白朮散，加肉豆豉作丸服。

如先發搐，后吐瀉者，此因病時多服利驚之藥，脾胃受傷所致。宜參苓白朮散，或散或蜜丸，如龍眼大，每用一丸，米飲下。如搐甚，下泄者，乃遺尿也不治。

痢疾發搐者，其病在肝。先病未止，又發搐者，此因誤服丁香、木香、豆蔻等辛熱止痢之劑太多，以致內有積熱，則生風也。蓋肝為厥陰，風木在裏，則便膿血在。外則為瘰癧，肝乃屬火，反服辛熱助火之藥，安得不發搐也。宜用瀉青丸，如黃芩、黃連、蜜丸，并草湯下。此

湯青三黃丸二方合也如痢止後發搐者作脾虛治  
同慢驚風法東垣調元湯加白芍湯主之

搐後變痢此表邪入裏也蓋風傷脾入裏則便膿血  
先用小柴胡湯加大黃下之後以加減龍薈丸主之

當歸

川芎

陳皮

青皮各一錢

黃連

酒洗

黃芩

酒炒各一錢

山枝

木香各五分

人參

炙草

各一錢

為末別用阿膠三錢溶化作丸陳米湯下

痘疾發搐者其病在肝脾此有三症或併病者痘至  
發熱則搐痘止搐止日日如之病如是者不必治搐

但治其瘥。人退插亦退也。勿起宜用劫藥。風瘥小柴  
胡湯。暑瘥用白虎湯。食瘥用平胃散。痰瘥用栝榔吐  
出其痰即愈。久瘥補脾平肝宜加戒平瘥養脾九主  
之。

黃芪 炙

人參 各一錢

白朮

當歸

白茯苓

半夏曲

黃芩

陳皮

常山

鱉甲 炙

枳實

使君子肉

各一

柴胡

草果

厚朴 姜

神曲 炒

肉桂 五分

青皮 六分

炙草

五分

七分

神曲糊丸陳米湯下

一先搐後瘳者此肝傳脾也宜養脾平瘳丸主之  
一先瘳後搐者脾虛損肝木乘之也為慢驚風治同  
慢驚。

一咳嗽發搐者病在肝肺肝木肺金金木相搏故成  
此病得此者多不治但覩新久衰旺何如如初得咳  
嗽數十声不止而發搐此痰盛氣逆也所謂氣逆而  
作搐痰聚而發驚是也宜丹溪薄荷湯主之如久咳  
發搐者面目唇白咳而喘促此肺虛而肝木乘之也  
病不可治無上証者身熱而渴宜小阿膠散或搐甚  
者宜先補肺後瀉肝補肺以阿膠散瀉肝以瀉青丸



主之

如搐後咳嗽者驚痰未去也。宜丹溪鎮驚丸主之。已上方並見前。

一丹毒發搐者病在少陽。少陽者脾之相火也。先搐後發丹瘡者此毒火自內出外也。可治。先發丹後發搐者毒自外入內也。必死。自內出者火之餘宜發散。解毒及砒法防丰通聖散主之。或用加減升麻葛根湯。

桔梗

乾葛

升麻

川芎

赤芍

歸尾

羌活

柴胡

甘草

各等

井水煎服此

驚丹之要藥也

一瘡癰發搖此胎毒也小兒身生虫疥浸淫痒痛不知用藥內服解毒之劑外用此硫毒藥搽之瘡忽自平或不擦自平者其候腹脹便秘膚無血色目閉不開而發搖者乃惡候也急進解毒之劑瘡出方生瘡不出加喘者死

雄黃

另研

壽金

各一兩

巴豆

八錢去油炒焦

乳香

沒藥

各二錢另研

各製為末

醋糊丸

硃砂衣

此方治諸

惡病甚妙

凡小兒末周歲者不問癰毒瘡疥丹瘤但發搖者皆難治脾胃嫩脆吞氣未實難以藥攻也

一痘疹發搐者其病在心初發熱時作搐此瘡毒欲出也。宜清心安神。導赤散入珠砂末調服。神効。瘡出搐止者吉。瘡出搐不止者凶。瘡正發時作搐者宜錢氏涼驚丸加珠砂主之。搐不止者不治。瘡結唇作搐者此非正醫。乃倒醫也。瘡毒陷于內乃凶惡之候。急用雄黃解毒丸茶草井水煎湯下。瘡復起者吉。搐不止者凶。

搐後餘症

病有搐久不止其舌黑者熱劇也。內服涼驚丸外用生薄荷葉煎湯洗之。舌轉紅者可治。王澐歌曰傷寒

舌黑洗不紅者凶藥洗明見吉凶即此意也  
一病有搖久未止大小便秘者宜八正散主之如大  
便四五日不通者不可利之恐損其胃氣宜豬胆汁  
通法通之神效

一病有唇内生瘡者此熱在心脾二經也內服洗心  
散外以藥連散加硃砂搽之神效

一病有目久其瞽似止不止神昏有痰者不早治之  
必成癰症此病在心宜利驚丸主之

胆草

防風

真青黛

蘆會

胆星

釣藤

錢各二

缺華粉

牙硝

錢各一

珠砂錢一

腦射少許

蜜丸 艾實大 每服一丸 金銀煎湯下

一病有搖時失音者宜木通湯主之

木通

石菖蒲

防風

苦梗

真桑螵蛸

全蝎焙

炙草

僵蚕各二錢半

胆星一錢

共末 每服二 字 紫蘇三片煎湯調服

一病有搖後失音者此痰入心肺竅中故也如不早

治必瘖成癰人矣宜加減錢氏安神丸主之

黃芪炙

人參

歸身

川芎

麥冬去心

石菖蒲

木通

炙草

遠志

去心姜汁浸

寒水石

各半

蜜丸芡寔大每服

一丸蘇葉三片煎湯下每日取債猶心連肺管屬

剖一半煎湯飲之以助藥力久服神效

一病有喘時鼻衄不止者此肺熱症肝乘肺也又有

心火上炎者以心火乘肺也宜瀉心肝之火硃砂涼

肺丸主之

黃芩

黃連

山枝

連喬

桔梗

甘草

人參

各等分

薄荷

減半

硃砂為衣蜜丸芡寔大麥冬湯下

一病有搐後目不明者此肝虛也地黃丸主之

一病後有餘熱不退者當察其虛寔治之如身壯熱面赤唇燥大小便不利此熱為寔因服補脾之藥太早宜小柴胡加大黃主之如面皤白大小便自調唇潤者此虛熱也宜清心丸主之

人參

麥冬

茯苓

柴胡

防風

炙草紹

硃砂細

五蜜丸次實大

金箔十片為衣每服一丸淡竹葉湯下

一病後發熱喘咳者當察其虛寔治之如身熱飲水鼻乾唇燥脉疾有力者此熱在心肺為寔宜從小便利之寧肺散

桑白皮炒

葶藶炒

赤茯苓

車前

炙子等分

天草洗半

姜束引煎服如面皯白不

熱不涓此虛也阿膠散主之

一病後肌膏消瘦精神昏憤者此驚癇也宜安神丸主之

茯神去心

蘆薈

琥珀

黃連

赤茯苓各三

胆星

遠志

甘草湯煮

洗乾

蝦蟇各一

石菖蒲

使君子各一

一

山藥煮糊丸灯心湯下

一病後食少形瘦者宜補脾和中丸主之



系氏異攻散

加青皮

砂仁

使君子

各一另取神曲作糊為丸陳米湯下

一凡病搐止後宜補胃參苓白朮散或蜜為丸甚効  
凡病搐後以券心安神定志丸主之  
方俱見前

癇

驚自心生風自肝

凡因病后見癇癰

急求妙手施方法

父母因循作癰殘

癇者其病卒然忽倒四肢強直目閉或翻上不轉口  
與或有咬其舌者口中涎出或有無涎者面色或青  
或白或作六畜声其狀不一乃小兒之惡候也一時

即經知常也。或曰或以旬日計或以月計或以年計。古人有三癩五癩之名証治太多。又與急慢驚同論似無一定之說。故後學不知其所從也。雖有論者不過依樣畫葫蘆耳。愚不自揣強為之辨。所謂三癩者原其得病之因也。所謂五癩者叙其病發之狀也。驚久成癩者慢驚風之變症也。不然何以小兒之發搐者皆有治法而發癩者至終身更無治法耶。管見如是惟高明者擇之。

一癩之所起因父母之循醫之無遠慮也。且知初發時或有不治自愈者。或有因損法而愈者。父母喜

之見其易退兒無他苦恬不加息或有頻發之時不  
過請醫捕之請巫縛之而已不知求上智之醫以斷  
之乃為終身不治之症此父母之過也其為醫者當  
視起病之時如風痼則發之食痼則下之驚痼則安  
之幸其病退以為能也及其再發不逆仍用前法而  
不思有結痰在心以致痼痼為終身之病此醫之過  
也

治痼之法幼科所載其方甚多而無可取者也惟  
氏五色丸室銍琥珀壽星丸及牛膝猪胆湯和蘇丸  
三者誠治痼之要藥也今予今此三法辨立一方屢

試屢驗如神乃名為斷痢丸

黃連

礞石

石菖蒲

硃砂

珍珠

鉄花粉

胆星各三

并遂三分

沉香二分

茯苓二分

共末熬膏為末別用人參

一錢白朮三錢煮糊為丸芡寔大每用一大取債

猪心一個劈開入藥在內將線札長流水煮熟取

出丸子研細灯心湯調下以猪心及汁與兒食之

三日服一丸又宜常服參沙膏以通心氣

硃砂五分

牙硝

雄黃二分

射香一分

金銀箔各十片

真白付子

枳壳各三

川芎

白茯苓

各四

人參

黃連

遠志

各二

前五味另研勻後七味共末和勻蜜丸芡實大每服一丸麥冬煎湯下此硃砂膏加減也

一癰之為病乃痰涎心竅之所致也初病之時使宜服通竅化痰鎮心之劑醫者慮不及此執用平日治驚之法父母不肯早治淹延年久其狀如痴如健忘者終不可治也常見在火水而卒強者後致跌傷亦多矣

一胎瘤由見在腹中受驚氣得之生未便有是病不可治也

按大無云一小兒周歲因長老摩頂受記僧人念咒  
恐懼發搐痰涎有聲目多白睛強項背一時許方醒  
後安見皂衣人卽發多服犀珠腦射鐵墜之藥已四  
年餘此症尚在又添行步動作神思如痴診其脉沉  
弦而急鍼經云心脉洪大痼瘕筋柔病久氣弱多服  
鎮墜寒涼之劑復損其氣故添動作如痴先灸兩湧  
各二壯然後服藥后肝脉小急蓋小兒神氣尚弱因  
而被驚神思無依一動于肝肝主筋故瘕瘕筋事立  
大名沉香天麻湯怪曰恐則氣下精怯而上焦所以  
羌活獨活之苦溫引氣上行又入太陽為引故用以

為君。天麻防風辛溫以散火。甘草當歸辛溫以補氣。血之不足故養脾氣。是以為臣。附子川烏益智大辛溫行陽退陰。又主助胃。腎主五液入咽為涎。以生薑半夏燥溫化痰。沉香辛溫體重氣清去怯安神。故以為使。

朱氏云。一小兒吐瀉。諸醫藥下之。至虛變慢驚。手足痙攣而身冷。醫復與八正散。口不能食。而胃中虛。故利大小便即死。久則脾腎俱虛。常身冷而目閉。必用益黃散。四君子丸補脾。遂能飲食。又不愈。以地黃丸補腎。一日而安。引此一事以為治痢者之法。

一灸法按鍼經云癰疽痼疾不知所苦而癰男陽女陰。黎古云晝發灸陽蹻中脉穴夜發灸陰蹻照海穴各二七壯。

一癰者手足或掣曲強直。或軟緩無力。不能舉動。或左或右。其人目視不正。口中流涎。語言蹇澁。因受風寒之氣得之。未得發散。初病擣時。日久不醒。以致風濕之氣深入筋骨。后雖擣止。手足之病未平。如五軟五癰之狀。父母因循不知。早治遂成癰疾。

一治癰之法。當視其在左在右。在左者為血虛。其治在肝。肝筋肝血虛。則筋無所養。故筋急拘掣強直。宜



補腎地黃丸主之。乃虛則補其母也。

山藥

山茱萸

酒洗取肉

熟地

獨活

川斷續

酒洗

白茯苓

丹皮

澤泄各二

手不利加桂

足不利加牛膝

手足俱不利並

加各二。系蜜丸。空心溫酒下。此地黃丸加減法也。

在右者為痰。其治在脾。脾主四肢。手足為液。痰流經

絡。故手足緩而不能舉也。宜補脾行痰。大補丸主之。

炙芪

人參

白朮

白茯苓

炙甘草

當歸酒

川芎

白芍

酒洗

半夏

陳皮

絡

川烏

炮

三

酒糊丸。姜湯下。此十全大

補湯加減也。更灸曲池三里捷骨肩髃各二十七壯。  
若口眼違向一邊者，灸頰車穴左灸右，右灸左，即止。

### 驚風諸症

兒多異病狀如癩。

莫作真搐一例看。

家秘幼科皆有法。

非人勿示泄心傳。

一天癇似癩。天癇者，壯熱驚悸，眼目翻騰，手足搐掣，或哭或笑，喜怒不常，甚者爪甲皆青，紫之狀，此肝病也。但小睡卧耳，宜鮮利風和則愈。釣藤散主之。

釣藤

白茯苓

各五

大黃

炮煨

防風

硃砂

蟬退

羌活

獨活

青皮

甘草

為末姜蜜調服此瀉青丸

加減也

又方用釣藤

人參

犀角屑

炙草

天麻

全蝎

各二分

為末薄荷湯調服

一內釣似瘋內釣者腹痛多啼唇黑囊腫偃倮反張  
眼內有紅筋斑黑者也此肝病也但不昏困耳乃受  
寒氣所致先是內腫抽掣極病狂躁則泄瀉縮脚腸  
痛頭啼內釣一過外証油掣又來內外交攻極難調  
理須分內外用藥治之內釣甚者宜乳香膏主之

乳香

五分

沉香

一分

為極細末蜜丸梧桐子大

每服二丸用

石菖蒲

釣藤

煎湯下

又方木香丸

沒藥

茴香

木香

各等分

釣藤同上

全蝎

乳香

各半

先研乳香另放後研上諸

藥為末

取蒜少許研和為丸梧桐子大每服二

丸酒下

按此二方治內釣之要藥也內釣甚者宜

釣藤丸主之

釣藤

白茯苓

各五

天麻

防半

硃砂

蟬退

羌活

獨活

青皮

炙草

各二

除殊砂

另研

餘為末

水煎

調殊砂末服

按天鈞內鈞二症百日内小兒多有之。此二者皆肝之病也。蓋厥陰肝經內行于小腸外行于背故外感傷風熱則為天鈞內傷寒冷則為內鈞故曰天鈞者陽也內鈞者陰也。

病有盤腸腹痛似內鈞者乃小腸氣痛也亦全腹痛作啼。佝僂腰曲乾痛多啼額上有汗此小腸為冷氣所搏然耳宜用和乎溫氣之劑。川練子散主之。眼內無紅筋黑睛囊不腫者。木香。小荷。

去渣

修一川練函 二系用已 五二位妙上 日 共木酒

一客忤似癇。小兒神氣怯弱。外邪客氣。獸馬異物。暴觸而忤之。其候口吐青黃白沫。水谷鮮。面色變異。喘急腹痛。反側痰涎。狀似驚癇。脈來弦急。而數視其口中懸癰。在左右。若有小腫核。即以竹針刺潰。或以指甲摘破治之。當辟邪正氣散。驚安神。久延則難為力也。古方作客忤及中惡者。急作醋炭服蘇合丸。此方治客忤中惡之要藥也。

全按客忤者。謂客邪之氣忤其兒之正氣也。論其所忤不但外邪之氣。與人物之氣。自鼻而入。乃外因之

客忤也。聞見之驚，自心而生，乃內因之客忤也。然和之所奏其氣必虛。小兒神氣既虛，故易動耳。和有微甚，治有輕重，勿科混同論之。所謂辨之未辨者矣。夫痼則病發而因忤，則病發而醒，此似痼而非痼也。若發而因亦真痼矣。予特表而出之。按手指三關紋，經曰：脈候若深青，情知四足驚，赤因水火符，紅色是人驚。此治客忤者，以此辨。養小兒之法，許見前卷育嬰四要中。凡小兒客忤中惡諸病，皆父母及抱養者之過也。或因生人遠來忤者，或因六畜忤者，或因感冷水忤者，皆外生者也。人

物之氣自鼻而入上衝巔項經曰五氣入鼻藏于心  
肺主皮毛心主血脈項巔之上諸陽之所會也邪  
中之即病矣宜用冰體法塗顙法治其外吹鼻法搐  
之內服對証之藥以扶正氣為主正氣勝則邪氣自  
退也 並用酸乳湯

病時睡不醒而喜睡者忤之微也宜發散醒之散

人參

白朮

白朮

炙草

桔梗

天花粉

各等分

細辛

減半

一方加防丰

川芎

各等分

水煎薄荷葉引微汗妙

浴休法

治客忤中惡白利諸証有邪者當宜浴之



川芎

蒼朮

白芷

藁木

零陵香

各等

長流水

煎去渣向無風處浴之浴

後睡片時

塗額法

治客忤白虎証伏龍肝散

灶心黃土和雄黃五

射少許東肉和丸捏作

餅子如不樣四圍出額一分額門上安餅取艾作

小炷灸三壯

搐鼻法一名救苦散治傷風寒頭目不清並客忤

川芎

藿香

藜蘆

各三

玄胡索

牡月皮

硃砂

各

為極細末少許吹鼻得嚏

則邪氣出矣

如病時客忤症悉具者此忤之甚也宜表裏發散  
生飲安神驚氣丸主之

攝生飲 治一切卒中太小科同

南星 包煨

木香

半夏 泡各半

北細辛

生花朮

石菖蒲

甘草 絡一

為末每用生姜同水煎調驚氣丸服

驚氣丸

治驚憂積氣又受風邪發則牙關緊急涎

潮昏塞醒則精神若痴又可治痛

木香

白僵蚕

白花蛇肉

酒洗

橘紅 白

天麻

麻黃

鐵華粉

全蠟

蘇子 一兩

胆星 半兩

硃砂 二名

腦射 少許

此許學士方也蜜丸芡寔大芎朮一丸痼用薄荷金銀湯下 已上治外中客忤之法

如抱兒騎馬或父母騎馬遠归未及換衣薰衣即抱其兒或戲抱兒在馬鞍上坐得病者此名馬客忤或聞馬嘶著驚者取馬尾燒烟薰兒面頻薰以醒為度如見生人異扮人或六畜跳躍異者或見神惡狀者或迅雷擊鼓一切大声使兒成客忤者此内生之病也宜安神去痰不用病根日深但見聞原忤之例即

發兒成癩矣抱龍丸主之

水銀二兩

鉛一兩五錢浴八水良制研以柳枝

燒成珠又入硃砂末乳香末各一兩在內乘熱用  
柳木槌搗勻為丸大寔大每一丸空心片花水下  
服后令睡不可驚動或作小丸服亦妙此平氏五  
色魴臧也

如見平常憤懣之人喜熒之果玩戲之物有所不得  
則忤其意但見神昏不食即其病也宜順意更與之  
及服安神之劑沉香丸主之

人參五分

白朮

陳皮去白

枳殼去

桔梗

青礞石

明段

金色礞石

炙草

沉香

珠砂

黃連

神曲

黍米大麥冬湯下

小兒客忤者。吾以為父母之過。有所喜者。乃戲而奪之。則怒而哭矣。有所畏者。乃戲而嚇之。則恐而驚矣。夫失所喜者。思則傷脾。遇所畏者。驚則傷心。因循而成癰。誰之過哉。

一中惡似癰。此客忤之甚者。乃小兒危急症也。其候因物中惡毒。心腹刺痛。腹皮青黑。不能啼息。悶亂欲死。立方治此。先用皂角末治鼻。急服蘇合香丸。全按

中惡與尸厥同但腹不鳴心腹俱煖也此有二症幼  
科未辨有中惡毒之氣自鼻而入心肺受之故忽然  
倒地四肢厥冷而手握拳不能喘息也有中惡毒之  
物自口而入腸胃受之故心腹刺痛腹皮青黑悶亂  
欲死者先用辟瘟散搐鼻令醒進藥仍以救鬼丸房  
內燒之以薰百鬼惡氣

辟瘟散

治卒惡死者

牙皂

三分

細辛

川芎

白芷 各五

羊躑躅花 粉雄黃 二分

射 少許

共末每用少許

寸心三寸長蘸點鼻內噴嚏為驗

殺鬼丸

雄雌黃各二帖半骨

虎頭各一

龍骨

鯨甲

鯨鱗甲

蜆皮各三

博鷄

十五枚无即

以川芎

白茯苓

鬼白

禹餘糧

東門上雄鷄頭一枚用蠟

二十兩為丸梧子大門口房內燒之男左女右臂

上帶一丸可辟百鬼

如中惡毒之氣即死者宜返魂湯主之即仲景麻黃

湯也

麻黃

三去根

杏仁

七去皮

炙草

一

水一盞煎半

盞分開細服

如中惡毒之病卒死者宜雄黃解毒丸主之

方見前

又方通治中毒用降真香

白膠香

沉香

虎頭骨

兔胆

龍胆草

人參

白茯苓

雄黃碎五

射一名煉蜜丸。寔大乳香湯下。或令兒佩帶一

丸即燒卧房妙

一兒忽大叫一声而悶絕者亦中惡例不治。

一白虎似豺。白虎者流年白虎神。太歲后五位是所

占之方不可犯也。小兒變蒸未滿者乳母無知抱兒

向其方頑戲更觸犯之。使兒不精爽。兩眼楊物不轉



手如數物此客忤之輕者也。宜用浴体法。更以穀鬼丸房內燒之。使兒聞其烟。又取伏龍肝搗醋和丸。塞入摩兒頭及五心。效。鄉俗婦人以鷄子一枚遍身摩之。送糞地埋之。亦穰法也。

一邪祟似痢。齡濯兒衣不可夜露。恐為稚鳥落羽所汚染。觸兒身。未有不為痢者。其後面色變不常見人。蓋怕宜常用煎浴。体法房中殺鬼丸。久以囊盛。一丸掛兒背上。男左女右。宜辟邪丸主之。

人參

白茯苓

炙草

使君子肉

夜明粉

藍塘辰砂

沉香 五分

雄黃 錢

殊砂

各半

黃連

各半

射

少許

猪胆汁和粟米糊

為丸黍米大每服二十一丸至三十五米飲下

一馬脾風似痢小兒肺脹喘滿胸高氣逆而脇痛動

鼻脹胸亂嗽喝聲啞痰涎潮塞俗謂之馬脾風者宜

雄黃奪命散主之

黑白丑

各兩半取頭末半兩

大黃

檳榔

各半

木香為末三歲者服二錢溫水調服涎多者加

輕粉少許方見丹溪附余

一蟲痛似痢小兒本怯致胃虛冷則虫痛而心痛口

中味及涎水出發痛有忤但目不斜手不搐也宜木

香化血丸主之

煨枹 一升

木香

鶴風

貫仲

錫灰

乾膝 炒尽烟

使君子肉

各五

輕粉 二升

巴豆肉

雷丸 各半 飛羅麵糊為

丸五更米飲下

一症。症似痛。其症頂背強直。腰身反張。搖頭掣手。瘳

瘳。口不語。發熱腹痛。鎮目不醒。病在足太陽經。其

候有二。如面紅眼赤。牙紫手張。痰涎壅甚。昏瞶煩渴。

小便赤澀。先譫語而發者。此剛症也。宜小柴胡加大

黃湯。方見前。

如大便滑泄不瀉不語手足先令而發者此柔痊也  
宜理中加桂枝湯主之。

理中湯加桂枝

白芍

水煎服